

CUADERNILLO 5.- HOMEOPATÍA POR SISTEMAS (SESIÓN 5)




SEMILLEROS DE FORMACIÓN DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS TEOZENTLI

2020

Mtra. Isis Damayanti
Ramírez Sandoval

5^a SESIÓN.- SISTEMA CIRCULATORIO, 20 PADECIMIENTOS CLÁSICOS DE LA MALA CIRCULACIÓN, INCLUIDO TRATAMIENTO DE APOYO PARA TROMBOSIS POR COVID-19


- | | | |
|--|--|---|
| a) ELABORACIÓN DE GOTAS HOMEOPÁTICAS | HOMEOPÁTICA PARA TRATAR LOS MISMOS. | 12. <u>HIPERTENSIÓN ARTERIAL</u> |
| b) ELABORACIÓN DE GLÓBULOS HOMEOPÁTICOS | 1. <u>ANEURISMA</u>
2. <u>APOPLEGÍA</u> | 13. <u>INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO O ATAQUE AL CORAZÓN</u> |
| c) EL ETIQUETADO HOMEOPÁTICO | 3. <u>ARTERIOESCLEROSIS</u> | 14. <u>INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA</u> |
| d) LA PROGRAMACIÓN TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA | 4. <u>ACCIDENTE CEREBROVASCULAR</u>
5. <u>ARRITMIAS</u> | 15. <u>LINFADENOPATÍA O GANGLIOS LINFÁTICOS INFLAMADOS</u> |
| e) EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 6. <u>CARDIOPATÍA REUMÁTICA</u> | 16. <u>TROMBOSIS</u> |
| f) FACTORES DE RIESGO PARA EL SISTEMA CIRCULATORIO Y LA ESPECIFICACIÓN DE LA TROMBOSIS EN COVID-19 | 7. <u>CARDIOPATÍA CONGÉNITA</u>
8. <u>DERRAME CEREBRAL</u>
9. <u>DIVERSOS TUMORES Y CÁNCERES</u> | 17. <u>ULCERA VARICOSA</u>
18. <u>VARIZ ESOFÁGICA</u>
19. <u>VARICOCELE</u> |
| g) 20 PRINCIPALES PADECIMIENTOS HEPATOBILIARES Y LA REPERTORIZACIÓN | 10. <u>FLEBITIS</u>
11. <u>HEMORROIDES</u> | 20. <u>VARIZ GÁSTRICA</u> |



Mtra. Isis Ramayanti
Ramírez Sandoval

A) ELABORACIÓN DE GOTAS HOMEOPÁTICAS

- LAS GOTAS HOMEOPÁTICAS SON ALTAMENTE RECOMENDABLES PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SON INTOLERANTES A
 - LA SACAROSA
 - LA LACTOSA
- SE PUEDEN ELABORAR PREPARANDO UN VEHÍCULO DE:
 - 70% AGUA DESTILADA
 - 30% ALCOHOL AL 70%
- 5 GOTAS DE LA DILUCIÓN HOMEOPÁTICA POR CADA 10 ML DE CAPACIDAD DEL GOTERO



B) ELABORACIÓN DE GLÓBULOS HOMEOPÁTICOS

- “LOS GRÁNULOS NEUTROS ESTÁN FORMADOS POR AZÚCARES, QUE NORMALMENTE CONTIENEN UN 80% DE SACAROSA Y UN 20% DE LACTOSA. TAMBIÉN PUEDEN ESTAR FORMADOS POR AZÚCARES SEMISINTÉTICOS COMO LA XILITA, CON LO QUE SE EVITAN LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA O LA DIABETES.”
- LA FORMA IDEAL ES PONER EL CONTENIDO DE UN FRASCO CONVENCIONAL (GENERALMENTE SON FRASCOS DE VIDRIO AMBAR DE CAPACIDAD DE 30 ML), EN UNA CHAROLITA CUBIERTA POR PAPEL ENCERADO DESECHABLE Y AGREGAR UN PICETAZO DE ALCOHOL DE 96° MÁS 5 GOTAS DE LA DILUSIÓN HOMEOPÁTICA A UTILIZAR POR CADA 10 ML DE CAPACIDAD DEL FRASCO DE GLÓBULOS HOMEOPÁTICOS.
- NOTA: CUANDO TENEMOS FRASCOS DE GLOBULOS HOMEOPÁTICOS GUARDADOS Y ESTOS YA ESTÁN SECOS, BASTARÁ CON AGREGAR UN PICETAZO DE ALCOHOL DE 96° Y SUCUSIONAR 50 A 100 VECES PARA PODER REACTIVAR EL MEDICAMENTO Y VOLVERLO A TOMAR.
- NOTA 2.- EN EL CASO DE LAS GOTAS HOMEOPÁTICAS, ESTAS NO TIENEN UNA VIDA TAN LARGA YA QUE EL VEHÍCULO SUELE DESCOMPONERSE POSTERIOR A 5 MESES (APROXIMADAMENTE)




C) EL ETIQUETADO HOMEOPÁTICO



- LA ETIQUETA HOMEOPÁTICA CONVENCIONAL QUE SE COMPRAS EN FARMACIAS HOMEOPÁTICAS, SUELE SER SOLO UN ENGOMINADO QUE DICE “MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO” Y LUCE UN CAMPO EN BLANCO PARA ANOTAR DATOS E INDICACIONES DE LA POSOLOGÍA.
 - LOS DATOS QUE POR ÉTICA DEBE CONTENER UNA ETIQUETA HOMEOPÁTICA SON:
- MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
- NOMBRE DEL PACIENTE
- MEDICAMENTO (S) Y POTENCIAS HOMEOPÁTICAS QUE CONTIENE
- FORMA DE TOMA (CANTIDAD Y HORARIOS)
- FECHA DE ELABORACIÓN
- PASOS DEL ETIQUETADO:
 - 1) SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS INDICADOS ANTES DE ELABORAR EL MEDICAMENTO
 - 2) COLOCARLO AL FRENTE DEL FRASCO QUE VAMOS A PREPARAR
 - 3) PREPARAR EL MEDICMANETO HOMEOPÁTICO, TAPAR Y SUCUSIONAR
 - 4) COLOCAR LA ETIQUETA HASTA EL FINAL PARA EVITAR QUE LE CAIGA ALCOHOL Y DEJE ILEGIBLE LA ESCRITURA Y DATOS CONTENIDOS EN ELLA


D) LA PROGRAMACIÓN TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA

- CUANDO SE HACE LA ETAPA DIAGNÓSTICA, NOSOTROS DESARROLLAREMOS UNA PROGRAMACIÓN A CORTO (1 MES), MEDIANO (2 MESES) Y LARGO PLAZO (4 MESES).
- ESTA PROGRAMACIÓN HA DE ANOTARSE EN EL EXPEDIENTE, Y SABER QUE ES UN ESTUDIO APRIORÍSTICO, QUE PUEDE EXPERIMENTAR CAMBIOS DEBIDO AL CAMBIO, EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN (APARENTE) DE LA SINTOMATOLOGÍA DE LAS PERSONAS A TRATAR.
- LA CONSULTA DEBERÁ REALIZARSE POR LO MENOS CADA 4 SEMANAS (SI LA PERSONA PRESENTA CRISIS QUE NO PUEDEN SUPERARSE CON LAS DINAMIZACIONES PLUS Y NECESITAN CAMBIO TOTAL DE TRATAMIENTO, ESTE TIEMPO SE DEBE ANULAR, TAMBIÉN SI LA PERSONA COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO REFIERE ANSIEDAD POR TENER CONSULTA ANTES DE ESTE TIEMPO, EL O LA TERAPEUTA DEBERÁN VALORAR SI ES FACTIBLE O NO).
- CADA SESIÓN, DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE UN SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO, INDAGANDO EN LOS FACTORES DEL SÍNTOMA, ADEMÁS DE ELLO, CUESTIONES EMOCIONALES, PSICOLÓGICAS Y DEMÁS INQUIETUDES DE LA PERSONA, CON ELLO QUEREMOS REVALORAR O AFIRMAR EL PRIMER PROGRAMA APRIORÍSTICO QUE REALIZAMOS EN LA PRIMER SESIÓN, PARA CON ELLO HACER EL AJUSTE NECESARIO EN EL SEGUIMIENTO DE NUESTRO TRATAMIENTO A INDICAR




E) EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CIRCULATORIO

- **¿QUÉ HACE EL CORAZÓN?**
 - EL CORAZÓN ES UNA BOMBA, QUE SUELE LATIR ENTRE 60 Y 100 VECES POR MINUTO. EN CADA LATIDO, EL CORAZÓN ENVÍA **SANGRE** A TODO EL CUERPO, TRANSPORTANDO OXÍGENO A TODAS SUS CÉLULAS. DESPUÉS DE DISTRIBUIR EL OXÍGENO, LA SANGRE VUELVE AL CORAZÓN. DESDE ALLÍ, LA SANGRE SE BOMBEA HACIA LOS **PULMONES**, DONDE SE VUELVE A CARGAR DE OXÍGENO. ESTE CICLO SE REPITE UNA Y OTRA VEZ.
 - **¿QUÉ HACE EL SISTEMA CIRCULATORIO?**
 - EL SISTEMA CIRCULATORIO ESTÁ FORMADO POR VASOS SANGUÍNEOS QUE TRANSPORTAN SANGRE DESDE EL CORAZÓN Y HACIA EL CORAZÓN. LAS **ARTERIAS** TRANSPORTAN LA SANGRE DESDE EL CORAZÓN AL RESTO DEL CUERPO, Y LAS **VENAS** LA TRASPORTAN DESDE EL CUERPO HASTA EL CORAZÓN.
 - EL SISTEMA CIRCULATORIO LLEVA OXÍGENO, NUTRIENTES Y HORMONAS A LAS CÉLULAS Y ELIMINA LOS PRODUCTOS DE DESECHO, COMO EL DIÓXIDO DE CARBONO. EL RECORRIDO QUE SIGUE LA SANGRE SIEMPRE VA EN LA MISMA DIRECCIÓN, PARA QUE LAS COSAS SIGAN FUNCIONANDO COMO DEBEN FUNCIONAR.
- TOMADO DE: [HTTPS://KIDSHEALTH.ORG/ES/TEENS/HEART-ESP.HTML#:~:TEXT=LAS%20ARTERIAS%20TRANSPORTAN%20LA%20SANGRE,COMO%20EL%20DI%C3%B3XIDO%20DE%20CARBONO.](https://kidshealth.org/es/teens/heart-esp.html#:~:text=LAS%20ARTERIAS%20TRANSPORTAN%20LA%20SANGRE,COMO%20EL%20DI%C3%B3XIDO%20DE%20CARBONO.)



F) FACTORES DE RIESGO PARA EL SISTEMA CIRCULATORIO Y LA ESPECIFICACIÓN DE LA TROMBOSIS EN COVID-19


- CONCRETAMENTE, EN EL ESCENARIO DEL COVID-19, EL 80% DE LOS TROMBOS SE PRODUCEN EN EL SISTEMA VENOSO Y SUELEN GENERARSE EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES, O EN EL PULMÓN
 - ¿PORQUÉ?
 - 1.- EL VIRUS PRODUCE UN ESTADO INFLAMATORIO EN SUS FASES MÁS GRAVES
 - 2.- LA INFLAMACIÓN ACTIVA MECANISMOS DE COAGULACIÓN
 - 3.- EN LA FASE MÁS AGUDA, QUE SUELE COMPLICARSE CON NEUMONÍA, SE PRODUCE UNA RESPUESTA INFLAMATORIA DEL ORGANISMO EN RESPUESTA A ESA INFECCIÓN
 - 4.- ESTA RESPUESTA INFLAMATORIA PUEDE LESIONAR VENAS Y ARTERIAS
 - 5.- EL REPOSO OBLIGADO DEBIDO A LA SITUACIÓN DE SALUD, PUEDE PROPICIAR LA FORMACIÓN DE TROMBOS (COÁGULOS EN LA SANGRE)
 - 6.- LA POBLACIÓN VULNERABLE, VIENE YA DE POR SI CON DEFICIENCIAS EN SU SALUD, FALTA DE MOVILIDAD ETC.





G) 20 PRINCIPALES PADECIMIENTOS HEPATOBILIARES Y LA REPERTORIZACIÓN HOMEOPÁTICA PARA TRATAR LOS MISMOS.

1. ANEURISMA



- UN ANEURISMA ES UN ENSANCHAMIENTO O ABOMBAMIENTO ANORMAL DE UNA PARTE DE UNA ARTERIA DEBIDO A DEBILIDAD EN LA PARED DEL VASO SANGUÍNEO.
- SUELEN PRODUCIRSE EN LA AORTA, EL CEREBRO, LA PARTE POSTERIOR DE LA RODILLA, EL INTESTINO O EL BAZO. UNA ROTURA DE ANEURISMA PUEDE OCASIONAR SANGRADO INTERNO O DERRAME CEREBRAL, Y PUEDE SER MORTAL.
- LOS ANEURISMAS NO SUELEN PRESENTAR SÍNTOMAS ANTES DE LA ROTURA.
- FASE DE ISQUEMIA AGUDA: RHUS TOXICODENDRON 30 CH + ARNICA 3 CH, ALTERNAR CADA 3 HORAS LOS DOS REMEDIOS E IR REDUCIENDO SEGÚN MEJORÍA HASTA 2 VECES/DÍA
- ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV).- STRAMONIUM 6 CH, 2 VECES/DÍA
- ACV ANTIGUO.- AGREGAR 200CH. 5 CADA 24 HRS.

Clasificación Leer mas:

<https://www.google.com/search?q=Aneurisma&oq=Aneurisma&aqs=chrome..69i57.771j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

2. APOPLEGÍA

- SÍNDROME NEUROLÓGICO DE APARICIÓN BRUSCA QUE COMPORTA LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL Y UN CIERTO GRADO DE PARÁLISIS MUSCULAR; ES DEBIDO A UN TRASTORNO VASCULAR DEL CEREBRO, COMO UNA EMBOLIA, UNA HEMORRAGIA O UNA TROMBOSIS.
- UN DERRAME CEREBRAL ES UNA EMERGENCIA MÉDICA.
- LOS SÍNTOMAS DEL DERRAME CEREBRAL INCLUYEN PROBLEMAS PARA CAMINAR, HABLAR Y ENTENDER; ADEMÁS DE PARÁLISIS O ENTUMECIMIENTO DEL ROSTRO, LOS BRAZOS O LAS PIERNAS.
-

- ALGUNOS MEDICAMENTOS QUE SE PUEDEN EMPLEAR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE APOPLEJÍA:

- OPIUM
- ARNICA
- LACHESIS
- GLONOIUNUM
- AURUM
- GLESEMIUM
- BELLADONA
- BOTROPS
- PHOSPHORUS
- COCCULUS
- ACONITUM

- VER CADA CARACTERÍSTICA EN:

<HTTP://DOCS.BVSALUD.ORG/BIBLIOREF/2018/03/880106/APOPLEJIA-SEMILOGIA-HOMEOPATICA-Y-MATERIA-MEDICA.PDF>



3. ARTERIOESCLEROSIS




- LA ARTERIOESCLEROSIS ES UNA AFECCIÓN EN LA CUAL PLACA SE ACUMULA DENTRO DE LAS ARTERIAS. PLACA ES UNA SUSTANCIA PEGAJOSA COMPUESTA DE GRASA, COLESTEROL, CALCIO Y OTRAS SUSTANCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SANGRE. CON EL TIEMPO, ESTA PLACA SE ENDURECE Y ANGOSTA LAS ARTERIAS. ESO LIMITA EL FLUJO DE SANGRE RICA EN OXÍGENO.

- ALGUNOS MEDICAMENTOS QUE SE PUEDEN EMPLEAR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE SINTOMATOLOGÍA DE LA ARTERIOESCLEROSIS:
 - **TABACUM**
 - **BARYTA MURIÁTICA**
 - **AURUM MURIÁTICUM**
 - **NATRUM IODATUM**
- **VER CADA TIPO DE SINTOMATOLOGÍA EN:**
[HTTPS://KINEPHARMA.ES/BLOG/2015/06/19/TRATAMIENTO-DE- LA-ARTERIOSCLEROSIS-CON-HOMEOPATIA/](https://kinepharma.es/blog/2015/06/19/tratamiento-de-la-arteriosclerosis-con-homeopatia/)

Clasificación Leer mas:

<https://medlineplus.gov/spanish/atherosclerosis.html#:~:text=La%20arterioesclerosis%20es%20una%20afecci%C3%B3n,de%20sangre%20rica%20en%20ox%C3%ADgeno.>

4. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR



- UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR SUCEDE CUANDO EL FLUJO DE SANGRE A UNA PARTE DEL CEREBRO SE DETIENE. ALGUNAS VECES, SE DENOMINA "ATAQUE CEREBRAL".
- SI EL FLUJO SANGUÍNEO SE DETIENE POR MÁS DE POCOS SEGUNDOS, EL CEREBRO NO PUEDE RECIBIR NUTRIENTES Y OXÍGENO. LAS CÉLULAS CEREBRALES PUEDEN MORIR, LO QUE CAUSA DAÑO PERMANENTE.
- **CAUSAS**
- HAY DOS TIPOS PRINCIPALES DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR:
- ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO
- ACCIDENTE CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICO
- EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO OCURRE CUANDO UN VASO SANGUÍNEO QUE IRRIGA SANGRE AL CEREBRO RESULTA BLOQUEADO POR UN COÁGULO DE SANGRE. ESTO PUEDE SUCEDER DE DOS MANERAS:
- SE PUEDE FORMAR UN COÁGULO EN UNA ARTERIA QUE YA ESTÁ MUY ESTRECHA. ESTO SE DENOMINA **ACCIDENTE CEREBROVASCULAR TROMBÓTICO**.
- UN COÁGULO SE PUEDE DESPRENDER DE OTRO LUGAR DE LOS VASOS SANGUÍNEOS DEL CEREBRO, O DE ALGUNA PARTE EN EL CUERPO, Y TRASLADARSE HASTA EL CEREBRO. ESTO SE DENOMINA EMBOLIA CEREBRAL O **ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EMBÓLICO**.

- ACONTITUM NAPELLUS 6 A 12 CH 5 CADA 4 HORAS. ENTUMECIMIENTO DESPUÉS DE UN ACCIDENTE CEREBRAL.
- BELLADONNA 12 CH 5 CADA 4 HORAS. PARA EL DERRAME CEREBRAL QUE DEJA HIPERSENSIBILIDAD ANTE EL MOVIMIENTO, CON VÉRTIGO Y TEMBLOR.
- KALI BROMATUM 6 CH 5 CADA 4 HORAS. EN QUE EXISTA INQUIETUD, RETORCIMIENTO DE LAS MANOS, REPETITIVIDAD EN MOVIMIENTOS Y TERRORES NOCTURNOS.
- NUX VÓMICA 6CH.. EN CASO DE PRESENTARSE PARESIA (DEBILIDAD MUSICAL), TRASTORNO DEL LENGUAJE Y CONVULSIONES..

Clasificación Leer mas:

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000726.htm#:~:text=Un%20accidente%20cerebrovascular%20sucede%20cuando,puede%20recibir%20nutrientes%20y%20ox%C3%ADgeno.>

5. ARRITMIAS



- TRASTORNO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (PULSO) O DEL RITMO CARDÍACO. EL CORAZÓN PUEDE LATIR DEMASIADO RÁPIDO (TAQUICARDIA), DEMASIADO LENTO (BRADICARDIA) O DE MANERA IRREGULAR.
UNA **ARRITMIA** PUEDE NO CAUSAR DAÑO, SER UNA SEÑAL DE OTROS PROBLEMAS CARDÍACOS O UN PELIGRO INMEDIATO PARA SU SALUD.
-


- AMBRA GRISEA
- CARBO VEGETABILIS
- GELSEMIUM
- IGNATIA AMARA
- NUX MOSCHATA
- NUX VÓMICA
- VERATRUM ALBUM
- CADA UNA EN DOSIS MÁXIMO 12 CH. 5 CADA 4 HRS.
- VER CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA EN:

<HTTP://WWW.SLD.CU/GALERIAS/PDF/SITIOS/MEDNAT/EL TRATAMIENTO HOMEOPATICO DE LAS PALPITACIONES Y DE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO.PDF>

Clasificación Leer mas:

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001101.htm#:~:text=Es%20un%20trastorno%20de%20a,peligro%20inmediato%20para%20su%20salud.>

7. CARDIOPATÍA CONGÉNITA



- LA CARDIOPATÍA CONGÉNITA (CC) ES UN PROBLEMA CON LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN PRESENTE AL NACER.
- **CAUSAS**
- LA CC PUEDE DESCRIBIR MUCHOS PROBLEMAS DIFERENTES QUE AFECTAN AL CORAZÓN. ESTE ES EL TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA MÁS COMÚN. LA CC CAUSA MÁS MUERTES EN EL PRIMER AÑO DE VIDA QUE CUALQUIER OTRO DEFECTO DE NACIMIENTO.
- LA CC SUELE ESTAR DIVIDIDA EN DOS TIPOS: CIANÓTICA (COLORACIÓN AZULADA PRODUCTO DE UNA RELATIVA FALTA DE OXÍGENO) Y NO CIANÓTICA.
- MISMAS INDICACIONES QUE EN LA ANTERIOR TIPO DE CARDIOPATÍA, INCORPORANDO
- CRATEGUS 6CH. 5 CADA 5 HRS.

Clasificación Leer mas: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001114.htm>

8. DERRAME CEREBRAL



- UN DERRAME CEREBRAL OCURRE CUANDO EL FLUJO DE SANGRE A UNA PARTE DEL CEREBRO ESTÁ INTERRUMPIDO POR LA PRESENCIA DE UN VASO SANGUÍNEO QUE ESTÁ BLOQUEADO O ROTO. LAS CÉLULAS DEL CEREBRO QUE NO RECIBEN UN SUMINISTRO CONSTANTE DE SANGRE OXIGENADA PUEDEN MORIR, CAUSANDO DAÑO PERMANENTE AL CEREBRO.
- HAY DOS TIPOS DE DERRAMES CEREBRALES: HEMORRÁGICO E ISQUÉMICO.
- UN **DERRAME CEREBRAL HEMORRÁGICO** OCURRE CUANDO SE ROMPE O DAÑA UN VASO SANGUÍNEO EN EL CEREBRO, PERMITIENDO ASÍ QUE LA SANGRE ESCAPE HACIA EL CEREBRO.
- UN **DERRAME CEREBRAL ISQUÉMICO** OCURRE CUANDO UN VASO SANGUÍNEO QUE LLEVA SANGRE AL CEREBRO ESTÁ BLOQUEADO O RESTRINGIDO DEBIDO AL MARCADO ESTRECHAMIENTO DE LAS ARTERIAS O A UNA MASA ENGROSADA DE SANGRE DENOMINADA **COÁGULO DE SANGRE**.
-
- ACONITUM NAPELLUS
- AYUDA A CALMAR A UNA PERSONA QUE ESTÁ EN UN ESTADO DE PÁNICO, CON MIEDO A MORIR MIENTRAS LE ATIENDEN EN URGENCIAS.
- BARYTA CARBONICA
- CUANDO HAY DEBILIDAD MENTAL Y DEBILIDAD EN UN LADO DEL CUERPO DESPUÉS DE UN ATAQUE. LA PERSONA TIENE COMPORTAMIENTO INFANTIL COMO CONSECUENCIA DEL ATAQUE.
- CAUSTICUM
- PARÁLISIS EN LOS MÚSCULOS DEL HABLA, PARÁLISIS DE LA VEJIGA, ENTUMECIMIENTO DE MANOS Y PIES. ES UN REMEDIO ESPECÍFICO PARA LA PARÁLISIS DEL LADO DERECHO.
- GELSEMIUM
- TRAS EL ATAQUE, DEBILIDAD Y TEMBLOR MUSCULAR, ENTUMECIMIENTO DE LA CARA Y LA LENGUA, PÁRPADOS CAÍDOS.
- LACHESIS
- PARÁLISIS DEL LADO IZQUIERDO TRAS EL ATAQUE. PARÁLISIS DE LENGUA Y GARGANTA.
- CADA UNA PUEDE SER SELECCIONADA E INDICADA (NO AL MISMO TIEMPO, SOLO UNA MÁXIMO 2, DEPENDIENDO EL CASO EN DOSIS DE 6CH A 12 CH. 5 CADA HORA COMO MÉTODO AUXILIAR, HASTA QUE CESE EL SÍNTOMA SE PODRÁ INDICAR 5 CADA 4 HRS.)

Clasificación Leer mas:

<https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=stroke#:~:text=Un%20derrame%20cerebral%20ocurre%20cuando%20el%20flujo%20de%20sangre%20a,causando%20da%C3%B1o%20permanente%20a%20cerebro.>

9. DIVERSOS TUMORES Y CÁNCERES



ENFERMEDADES CIRCULATORIAS



Caso 3

- *Carcinoma hepático*. Hombre de 74 años, con diagnóstico de tumoración maligna hepática.
 - *Aurum sulphuratum* en LM, plus, 1 mes, seguido de
 - *Scirrhinum 200c*, plus, 1 semana.
 - De nuevo *Aur-s.* y *Scirrh.* Alternados cada semana.
 - TAC (a los 2 meses): reducción del tumor
 - *Aur-s.* es el remedio constitucional:
 - Muy responsable, serio, dictatorial, autoritario, control estricto emociones, muy religioso, fuerte instinto sexual reprimido con responsabilidad hacia su esposa.
 - *Scirrhinum*, como nosode del Cáncer hepático en tumoraciones muy duras y de hígado.
 - A los 6 meses un nuevo control TAC, muestra una mayor reducción del tumor. Buen estado general.

FAVOR DE REVISAR LA BIBLIOGRAFIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO, DONDE VIENEN CASOS CLÍNICOS Y ELECCIÓN DE TRATAMIENTOS HOMEOPÁTICOS.

- HTTP://SCIELO.SLD.CU/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTE&PID=S1028-47962002000100002

10. FLEBITIS



- EXISTEN DOS CLASES DE FLEBITIS. LA MÁS COMÚN ES LA HINCHAZÓN DE UNA VENA QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL, GENERALMENTE EN LA PIerna. ES LA DENOMINADA «FLEBITIS SUPERFICIAL». LA HINCHAZÓN DE LAS VENAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA PIerna ES MENOS COMÚN PERO MÁS GRAVE. ES LA DENOMINADA «FLEBITIS PROFUNDA».

- HAMAMELIS 3 A 6 CH, 5 GLOBULOS, DOS VECES AL DÍA
- PULSATILLA 6CH. PARA ALIVIAR LAS PIERNAS PESADAS Y DOLORES AGRAVADAS POR EL CALOR.
- AESCULUS HIPPOCASTANATUM 3 A 6 CH, 3 GLOBULOS, 3 VECES AL DÍA CUANDO DEBE ESTAR DEMASIADO TIEMPO DE PIE O EN UNA SOLA POSTURA
- VIPERA 4 A 5 CH, 3 VECES AL DÍA. CUANDO HAY SENSACIÓN DE ESTALLIDO ACOMPAÑADA DE DOLOR.
- OTROS:
- ZINCUM METAL 4 A 5 CH
- APIS MELLIFICA 9 CH,
- ARNICA MONTANA 9 CH
- (CUALQUIERA DE ESTOS TRES 5 GLOBULOS AL DÍA

Clasificación Leer mas: <https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/flebitis/>

11. HEMORROIDES



- TAMBIÉN LLAMADAS ALMORRANAS, SON VENAS HINCHADAS EN EL ANO Y LA PARTE INFERIOR DEL RECTO, SIMILARES A LAS VENAS VARICOSAS. LAS HEMORROIDES PUEDEN DESARROLLARSE DENTRO DEL RECTO (HEMORROIDES INTERNAS) O DEBAJO DE LA PIEL ALREDEDOR DEL ANO (HEMORROIDES EXTERNAS).
- PUEDE HABER HEMORROIDES EXTERNAS, INTERNAS O TROBOSADAS..
- VER LA DIFERENCIA EN LA BIBLIOGRAFÍA Y ENLACE INDICADO ABAJO
- SEPIA,
- PUSATILLA,
- LYCOPodium,
- KALIUM CARBONICUM,
- LACHESIS O
- GRAPHITES
- VER EN UN REPOSITORIO O MATERIA HOMEOPÁTICA, CUAL SERÍA LA MÁS CONVENIENTE SEGÚN EL CASO A TRATAR...
- LA DOSIS ES QUE PARA DHEMORROIDES INTERNAS O EXTERNAS SI COMPLICACIONES, SE USARÁN DOSIS DE 6 A 12 CH
- PARA TROMBOSADAS O ULCERADAS EXTERNAS SE USARAN 12 CH HASTA 39 CH.

Clasificación Leer mas: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hemorrhoids/symptoms-causes/syc-20360268#:~:text=Las%20hemorroides%20internas%20en%20general,similares%20a%20las%20venas%20varicosas.>

12. HIPERTENSIÓN ARTERIAL




- CUANDO NOSOTROS HABLAMOS DE LA PRESIÓN ARTERIAL ESTAMOS HACIENDO ALUSIÓN A LA INTENSIDAD CON LA CUAL LA SANGRE FLUYE A TRAVÉS DE VASOS SANGUÍNEOS Y ARTERIAS CONECTADAS A NUESTRO MÚSCULO CORAZÓN; EXISTEN APARATOS ESPECIALIZADOS - PRINCIPALMENTE EL BAUMANÓMETRO-, QUE NOS AYUDAN A MEDIR LA PRESIÓN CON LA CUAL NUESTRO ÓRGANO CORAZÓN BOMBEA EN DOS MOVIMIENTOS IMPORTANTES: UNO QUE ES CUANDO SE CONTRAE QUE SE LLAMA SÍSTOLE Y OTRO QUE ES CUANDO SE RELAJA, Y SE EXPANDE QUE SE LLAMA DIÁSTOLE; ESTE TIPO DE APARATOS, MIDEN LA FUERZA CON LA CUAL SE EJERCE ESA PRESIÓN ARTERIAL E INDICAN CÓMO ES QUE NUESTRO CORAZÓN BOMBEA LA SANGRE HACIA EL ORGANISMO MEDIANTE LAS ARTERIAS QUE A SU VEZ DIRIGEN O CANALIZAN ESTA SANGRE AL RESTO DEL ORGANISMO A TRAVÉS DE UNA INTRINCADA RED DE VENAS Y CAPILARES PARA CUMPLIR CON SU LABOR DE IRRIGACIÓN A TODO EL ORGANISMO.
LA CIFRA ACEPTABLE DE PRESIÓN ARTERIAL ES 120/ 80 ESTO QUIERE DECIR QUE EL APARATO BAUMANÓMETRO VA A MEDIR UNA PRESIÓN DE 120 EN LA SÍSTOLE CUANDO NUESTRO CORAZÓN SE CONTRAE, IMPULSANDO LA SANGRE Y UN 80 DE DIÁSTOLE QUÉ ES LA INTENSIDAD QUE UTILIZA NUESTRO CORAZÓN PARA RELAJARSE; SE CONSIDERA ACEPTABLE DIEZ NIVELES ARRIBA O DIEZ NIVELES ABAJO, ES DECIR UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 130/90 O UNA PRESIÓN POR DEBAJO DE 110/70; FUERA DE ESTOS PARÁMETROS ESTAMOS HABLANDO DE UNA PRESIÓN ARTERIAL ALTA O BAJA.

Clasificación Leer mas:

<https://www.facebook.com/search/top/?q=hipertensi%C3%B3n%20arterial&epa=FILTERS&filters=eyJycF9hdXRob3liOiJXCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JfbWVclixdmFyZ3NcljpcIiwifSJ9>

13. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO O ATAQUE CORAZÓN



- “SE CARACTERIZA POR LA MUERTE DE UNA PORCIÓN DEL MÚSCULO CARDÍACO QUE SE PRODUCE CUANDO SE OBSTRUYE COMPLETAMENTE UNA ARTERIA CORONARIA.
- EN LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PRODUCE LA OBSTRUCCIÓN EL APORTE SANGUÍNEO SE SUPRIME. SI EL MÚSCULO CARDIACO CARECE DE OXÍGENO DURANTE DEMASIADO TIEMPO, EL TEJIDO DE ESA ZONA MUERE Y NO SE REGENERA.”
- “

- TRATAR Y PREVENIR :
- AURUM,
- ARGENTUM NITRICUM,
- PLUMBUM,
- LACHESIS,
- NAJA,
- VIPERA Y
- ACONITUM NAPELUS.
- *VER ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO Y PROCURAR QUE LAS DOSIS SEAN BAJAS (6CH A 12CH) O MEDIAS 30CH 5 CADA 4 HRS.

Clasificación Leer mas: <https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio.html>

14. INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA



- "OCURRE CUANDO EL CORAZÓN NO ES CAPAZ DE BOMBEAR LA SANGRE DE MANERA EFICAZ. ESTO PRODUCE QUE LA SANGRE Y LOS LÍQUIDOS SE ACUMULEN EN LOS PULMONES, HÍGADO Y OTROS ÓRGANOS, DE MODO QUE EL CORAZÓN TIENE QUE ESFORZARSE MÁS PARA BOMBEAR SANGRE AL RESTO DEL CUERPO.
- LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA NO ES LO MISMO QUE EL INFARTO CARDÍACO."
- SIGNOS Y SÍNTOMAS:
- PIES, TOBILLOS Y, A VECES, ABDOMEN HINCHADOS
- AUMENTO DE PESO DEBIDO A LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y TOSER
- LATIDOS CARDÍACOS ACCELERADOS O INTERMITENTES (PALPITACIONES)
- MALESTAR ESTOMACAL, NÁUSEAS Y VÓMITOS, Y PÉRDIDA DE APETITO
- DIFICULTAD PARA DORMIR
- FATIGA, DEBILIDAD Y UNA CAPACIDAD REDUCIDA PARA HACER EJERCICIO
- MAREO
- DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE O MANTENERSE ALERTA

- **DIGITALIS PURPUREA**
- **AURUM METALLICUM 6CH. INSUFICIENCIA CARDÍACA ACOMPAÑADA DE UNA DEPRESIÓN VASCULAR,**
- **APOCYNUM CANNABINUM 6CH.- INSUFICIENCIA CARDIACA CON BRADICARDIA**
- **PHOSPHORUS 6CH.- PARA ATENUAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA**

* 5 CADA 4 HRS.

Clasificación Leer mas:

<https://www.childrensmn.org/educationmaterials/childrensmn/article/17469/insuficiencia-cardiaca-congestiva/#:~:text=La%20insuficiencia%20card%C3%ADaca%20congestiva%20ocurre,sangre%20al%20resto%20del%20cuerpo.>

15. LINFADENOPATÍA O GANGLIOS LINFÁTICOS INFAMADOS



- LOS GANGLIOS LINFÁTICOS ESTÁN PRESENTES EN TODO EL CUERPO, PERO HAY GRUPOS PARTICULARES EN EL CUELLO, LAS AXILAS, Y LA REGIÓN INGUINAL; UNOS GANGLIOS PEQUEÑOS (< 1 CM) A MENUDO SON PALPABLES EN ESAS ÁREAS EN LAS PERSONAS SANAS.
- LA **ADENOPATÍA** ES EL AGRANDAMIENTO PALPABLE (> 1 CM) DE ≥ 1 GANGLIO LINFÁTICO; SE CLASIFICA COMO
- LOCALIZADO: CUANDO ESTÁ PRESENTE EN UNA SOLA ÁREA DEL CUERPO
- GENERALIZADO: CUANDO ESTÁ PRESENTE EN ≥ 2 ZONAS DEL CUERPO
- LA **LINFADENITIS** ES UNA ADENOPATÍA CON DOLOR Y/O SIGNOS DE INFLAMACIÓN (P. EJ., ERITEMA, HIPERSENSIBILIDAD).
- OTROS SÍNTOMAS PUEDE ESTAR PRESENTES DEPENDIENDO DE LA ENFERMEDAD SUBYACENTE.
-

- BELLADONA: ANTE EL ESTADO TOXO-INFECCIOSO INICIAL. FIEBRE DE APARICIÓN BRUSCA, ACOMPAÑADA DE CEFALEA CON OJOS CONGESTIONADOS, SED INTENSA.
- APIS MELLIFICA: ANTE EL CUADRO QUE CONTINUA AL ANTERIOR, PERSISTE FIEBRE (PERO SIN SED). SE MANTIENEN LOS SIGNOS INFLAMATORIOS LOCALES, TOLERA Y MEJORA CON APLICACIONES FRIAS.
- RHUS TOXICODENDRUM: SI AL CUADRO INICIAL SE AÑADE LA APARICIÓN DE VESÍCULAS (FLICTENAS) EN LA ZONA INFLAMATORIA. PRECAUCIÓN: INCOMPATIBLE CON APIS.
- NUX VOMICA: SI AL CUADRO TOXO-INFECCIOSO SE ASOCIAN NÁUSEAS Y VÓMITOS VIOLENTOS CON SENSACIÓN DE MEJORÍA AL VOMITAR
- CUALQUIERA A LA 6CH 5 CADA 4 HRS.
- VER MAS EN:
HTTP://SCIELO.SLD.CU/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1025-0255200000500010

Clasificación Leer mas: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-cardiovasculares/trastornos-linf%C3%A1ticos/linfadenopat%C3%ADas>

16. TROMBOSIS



- CUANDO SE FORMA UNA CÓAGULO DE SANGRE EN UNA VENA DE LA PIerna SE INTERRUMPE EL FLUJO NORMAL DE SANGRE HACIA EL CORAZÓN.
- LA SANGRE QUE VA DESDE EL CORAZÓN HACIA LOS PIES CIRCULA POR LAS ARTERIAS. UNA VEZ EN EL PIE, A TRAVÉS DE LOS CAPILARES, LA SANGRE VUELVE POR LAS VENAS HACIA EL CORAZÓN. Y DEL CORAZÓN A LOS PULMONES, PARA OXIGENARSE. **CUANDO LA SANGRE SE COAGULA EN EL INTERIOR DE UNA VENA IMPIDE SU RETORNO HACIA EL CORAZÓN**, ENTONCES LA SANGRE SE ACUMULA EN LA PIerna Y POR ESTO SE HINCHA Y DUELE.
- LA **TROMBOSIS** EN EL INTERIOR DE UNA VENA PROFUNDA ES UN FENÓMENO QUE PODRÍAMOS COMPARAR AL DE LA LECHE CUANDO SE CONVIERTEN EN YOGUR: **LA SANGRE SE SOLIDIFICA Y DIFICULTA O IMPIDE SU CIRCULACIÓN HABITUAL**.
- COMO LA SANGRE EN EL INTERIOR DE LAS VENAS VA SIEMPRE HACIA EL CORAZÓN, Y DE AHÍ A LOS PULMONES A TRAVÉS DE LAS ARTERIAS PULMONARES, CUANDO UN TROMBO VENOSO SE ROMPE Y SE DESENGANCHA DE LA PARED DE LA VENA DONDE SE HA FORMADO VA A PARAR EN ÚLTIMA INSTANCIA A LAS ARTERIAS DE LOS PULMONES. UNA VEZ ALLÍ OCLUYE EL INTERIOR DE UNA O MÁS ARTERIAS PULMONARES, Y EN ESTO CONSISTE LA EMBOLIA PULMONAR (EP).

• TRATAMIENTO DEL DOLOR

- LOS DOLORES INTENSIFICADOS POR EL CALOR Y LAS PIERNAS PESADAS SON TRATADAS CON 5 GRÁNULOS DE HAMAMELIS 3 A 6CH, A TOMAR 2 VECES AL DÍA, ASOCIADO A PULSATILLA. SI EL PACIENTE SIENTE PESADEZ EN LAS PIERNAS, INTENSIFICADA AL ESTAR DE PIE Y POR EL CALOR, 3 GRÁNULOS DE AESCULUS HIPPOCASTANUM DILUIDO ENTRE 3 Y 6 CH, ASOCIADO A SULFUR, PUEDEN SER TOMADOS 3 VECES AL DÍA PARA ALIVIAR LA DOLENCIA.

• TRATAMIENTO DEL SÍNDROME INFLAMATORIO


- PARA TRATAR LA CIANOSIS DE LA PIEL, HAY QUE TOMAR 3 GRÁNULOS DE VIPERA REDI 4 A 5 CH 3 VECES AL DÍA. CUANDO EL PACIENTE SIENTE UNA SENSACIÓN DE CONTUSIÓN SENSIBLE AL TACTO Y A LA FRICCIÓN, SE RECOMIENDAN DE 4 A 6 TOMAS DIARIAS DE ARNICA MONTANA.

• TRATAMIENTO DE LA IMPACIENCIA


- LA IMPACIENCIA SE MANIFIESTA A TRAVÉS DEL DESEO PERMANENTE MOVER UN MIEMBRO. EN LA PERSONA CON FLEBITIS EN LOS MIEMBROS INFERIORES, ES POSIBLE TRATAR LA IMPACIENCIA CON ZINCUM METALLICUM DILUIDO A 4 O 5 CH.

- [HTTP://WWW.GUIADELAHOMEOPATIA.COM/PATOLOGIAS/TROMBOSIS/](http://WWW.GUIADELAHOMEOPATIA.COM/PATOLOGIAS/TROMBOSIS/)

Clasificación Leer mas: <https://trombo.info/enfermedad-tromboembolica/trombosis-venosa-profunda/>



17. ULCERA VARICOSA



- UNA ÚLCERA CUTÁNEA ES UN TIPO DE HERIDA QUE SE FORMA EN LA PIEL. UNA ÚLCERA **CUTÁNEA VARICOSA** ES UNA HERIDA POCO PROFUNDA QUE SE PRODUCE CUANDO LAS VENAS DE LA PIerna NO DEVUELVEN LA SANGRE AL CORAZÓN COMO DEBERÍAN. ESTO SE LLAMA INSUFICIENCIA VENOSA. VEA UNA IMAGEN DE LA [CIRCULACIÓN SANGUÍNEA ANORMAL CAUSADA POR INSUFICIENCIA VENOSA](#).
- ESTAS ÚLCERAS SUELEN FORMARSE A LOS COSTADOS DE LA PARTE BAJA DE LA PIerna, POR ENCIMA DEL TOBILLO Y POR DEBAJO DE LA PANTORRILLA. VEA UNA IMAGEN DE LAS [ZONAS AFECTADAS POR LAS ÚLCERAS CUTÁNEAS VARICOSAS](#).
- LAS ÚLCERAS CUTÁNEAS VARICOSAS TARDAN EN SANAR Y A MENUDO REAPARECEN SI NO TOMA MEDIDAS PARA PREVENIRLAS.
- UNA ÚLCERA CUTÁNEA VARICOSA TAMBIÉN SE LLAMA ÚLCERA POR ESTASIS EN LA PIerna.
-

- HAMAMELIS VIRGINIANA 6CH.- DOLOR DE VENAS, SENSIBILIDAD ALA TACTO, VARICOSIDADES AZULES
- APIS MELLIFICA 6CH.- PICAZÓN, ARDOR ANTE EL CALOR AMBIENTAL, QUE MEJORA CON LA APLICACIÓN DE COMPRESAS FRÍAS
- SEPIA OFFICINALLIS 6CH.- CUANDO LA APARICIÓN DE MOLESTIAS ES DERIVADO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.
- VIPERA REDI 6CH.- PIERNAS CON SENSACIÓN DE PESANTEZ, DOLOR, OSCURECIMIENTO Y DILATACIÓN VENOSA, QUE MEJORA CUANDO SE ELEVAN LAS PIERNAS.
- CUALQUIERA 5 GLÓBULOS CADA 4 HRS.

Clasificación Leer mas: <https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-english/temas-de-salud/ulcera-cutanea-varicosa-tn8004>

18. VARIZ ESOFÁGICA



- LAS VÁRICES ESOFÁGICAS SUELEN APARECER CUANDO SE OBSTRUYE LA IRRIGACIÓN SANGUÍNEA AL HÍGADO. GENERALMENTE APARECEN EN LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS AVANZADAS.
- GENERALMENTE NO HAY SÍNTOMAS, A MENOS QUE LAS VENAS SANGREN. LOS SÍNTOMAS DE LAS VÁRICES ESOFÁGICAS SANGRANTES INCLUYEN VOMITAR SANGRE, HECES NEGRAS Y PARECIDAS AL ALQUITRÁN, Y SHOCK EN LOS CASOS MÁS GRAVES.
- LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN BETABLOQUEANTES, PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PARA DETENER EL SANGRADO Y, EN CASOS POCO FRECUENTES, TRASPLANTE DE HÍGADO.
-
- LYCOPodium 6CH.- AYUDA A DESCONGESTIONAR LA VARICE
- SULPHUR 12 CH.- PARA DESINFLAMAR TODO EL TEJIDO VENOSO
- ZINC 6CH.- REDUCIR EL DOLOR DE LAS VENAS DAÑADAS

Clasificación Leer mas:

<https://www.google.com/search?q=VARIZ+ESOF%C3%A1GICA&oq=VARIZ+ESOF%C3%A1GICA&aqs=chrome..69157j0l7.829j0l4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#wphtab=s:H4sIAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDYxKCt4xOjMlfDyxz1hKafJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKK0UuNig7JkuHilElo0GKS4uRBcnJ1MHPilqUVimanli1gFwhyDPKMUXIP93Q43uns6OwIAqVc0f3EAAAA>

19. VARICOCELE



- EL **VARICOCELE** ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE ESTERILIDAD EN LOS HOMBRES. IMPLICA UN RIESGO PARA LA FERTILIDAD Y SUELE SER PROGRESIVO, CON DETERIORO PAULATINO DE LA FUNCIÓN TESTICULAR.
- CONSISTE EN UNA **DILATACIÓN DE LAS VENAS** QUE DRENAN LA SANGRE DE LOS TESTÍCULOS (PLEXO PAMPINIFORME).
- SE PRODUCE POR UN REFLUJO O DESCENSO DE LA SANGRE DESDE LA VENA RENAL AL TESTÍCULO Y ESTO OCASIONA UNA DILATACIÓN VARICOSA DE LAS VENAS TESTICULARES Y SECUNDARIAMENTE UNA LESIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS TESTÍCULOS.
- EN EL 87% DE LOS CASOS AFECTA AL LADO IZQUIERDO, EN EL 7% ES BILATERAL Y EN EL 3% SOLAMENTE AFECTA AL LADO DERECHO.
-

- **AURUM METALLICUM:** VARICOCELE SEVERO, PROGRESIVO, PEOR DEL LADO DERECHO, MUY DOLOROSO SOBRE TODO DE NOCHE. PUEDE ESTAR ASOCIADO A ENFERMEDADES DEGENERATIVAS O MALIGNAS.
- **HAMAMELIS.** INDICADO EN VÁRICES ESOFÁGICAS. VÁRICES CON GRAN SENSIBILIDAD Y DILATACIÓN, CON GRAN TENDENCIA A LAS HEMORRAGIAS. VENAS VARICOSAS EN LA FARINGE, DE COLOR AZUL*. VARICOCELE.
- **RUTA.** VARICOCELE POR ESFUERZOS*. MEJORÍA DE LAS VÁRICES CAMINANDO*
- TODAS A LAS 6CH O 12 CH 5 GLÓBULOS CADA 4 HRS

Clasificación Leer mas: <https://www.institutouroandrologico.com/servicios/varicocele/>

20. VARIZ GÁSTRICA



- LAS VARICES GÁSTRICAS SE PUEDEN DISTINGUIR TÍPICAMENTE EN CARDIACO O FUNDIC DEPENDIENDO DE SU SITUACIÓN. LAS VENAS SUBMUCOSAL DEL GLOBO DEL ESTÓMAGO HACIA ARRIBA (DILATE) DEBIDO A LAS VARICES GÁSTRICAS. CUANDO LA PRESIÓN ESTÁ MÁS EN LAS VENAS PORTA QUE ESO EN LA VENA CAVA INFERIOR, LAS CONDICIONES SECUNDARIAS SE CONVIERTEN DANDO POR RESULTADO LOS BUQUES SUBMUCOSAL INFLADOS Y SINUOSOS EN EL ESTÓMAGO. ESTO LLEVA A UNA CONDICIÓN FATAL CUANDO HAY EXTRACCIÓN DE AIRE INTERNA PROFUSA DEBIDO A LA PRESIÓN PORTA QUE ES MÁS ALTA DE 12 MILÍMETROS HECTOGRAMO.
- LAS VARICES SE CORRELACIONAN ALTAMENTE A LA CIRROSIS DEL HIGADO Y CORRESPONDIENTEMENTE A LA HIPERTENSIÓN PORTA.
-

- **CALCAREA FLUORICA Y SILICEA ESTIMULAN LA RECUPERACIÓN DE LA TONICIDAD DE LAS VÁLVULAS VENOSAS**
- **KALI MURIATICUM Y NATRUM PHOSPHORICUM CUANDO HAY PREDISPOSICIÓN GENÉTICA**
- **FERRUM PHOSPHORICUM, NATRUM MURIATICUM Y NATRUM SULPHURICUM PUEDEN PROVEER AUXILIO, SOBRE TODO CUANDO LOS PACIENTES TIENEN MUCHO TIEMPO CONSUMIENDO ANALGÉSICOS DE MANERA INDISCRIMINADA**
- **DOSIS BAJAS 5 CADA 4 HORAS.**

Clasificación Leer mas: [https://www.news-medical.net/health/Gastric-Varices-Signs-and-Symptoms-\(Spanish\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Gastric-Varices-Signs-and-Symptoms-(Spanish).aspx)